




Plantas (árboles, arbustos, hierbas y bejucos) en el Parque Biblioteca Boquete

Elaborado por: Rafael R. Rincón ^{1,2,3}, Luis M. Vargas ^{1,3} y Loraine G. Pérez ^{1,2}
Fotografías: Luis M. Vargas



2024

Plantas (árboles, arbustos, hierbas y bejucos) en el Parque Biblioteca de Boquete

Autores: © Rafael R. Rincón, Luis M. Vargas, Loraine G. Pérez

ISBN: 978-9962-24-443-1



9 789962 244431

Editorial: Universidad Autónoma de Chiriquí
Dirección: Universidad Autónoma de Chiriquí
Ciudad Universitaria, Vía Interamericana,
David, Chiriquí, República de Panamá
Tel: (507) 730-5300

Primera edición: Diciembre 2024

Ficha técnica: 14 x 22 cm

Páginas: 35 páginas

Fotos de la portada: Parque Biblioteca de Boquete

Diseño y diagramación: Luis M. Vargas

Impresión: Impresora Comercial S.A.

Fotografías: Luis M. Vargas

Aviso legal: reservamos todos los derechos, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, sin previa autorización de los titulares del copyright. Las infracciones de dichos derechos pueden constituir un delito contra la propiedad intelectual.



Plantas (árboles, arbustos, hierbas y bejucos) en el Parque Biblioteca Boquete

Elaborado por: Rafael R. Rincón ^{1,2,3}, Luis M. Vargas ^{1,3} y Loraine G. Pérez ^{1,2}

Fotografías: Luis M. Vargas

Generalidades

El Parque Biblioteca Boquete fue creado mediante la resolución N°. IA-021 de 25 de marzo de 2021; como un proyecto auspiciado por la Fundación Biblioteca de Boquete, el Municipio de Boquete y los pobladores de Boquete.

Está localizado en Bajo Boquete, a orillas del Río Caldera y ocupa un terreno de 8,2 hectáreas. Cuenta con áreas verdes y jardines, en donde hay plantas nativas de la región y plantas introducidas; además hay mejoras que 3 lagos, senderos y vías internas para caminar, mesas, bancas, baños.

Tiene como objetivo servir para el esparcimiento familiar y actividades educativas; con interés social, ecológico y turístico.

El Centro de Investigación de Cultivo de Tejidos Vegetales y el Herbario de la Universidad Autónoma de Chiriquí, contribuyen a alcanzar los objetivos del Parque Biblioteca de Boquete; mediante la presentación de este documento, en donde presentamos una guía fotográfica con datos básicos de 175 plantas localizadas dentro de las instalaciones de este Parque. El trabajo realizado para obtener la información aquí contenida es uno de los productos del proyecto de extensión “Guía para reconocimiento de plantas en el Parque Biblioteca Boquete, herramienta para educación ambiental de la población boqueteña”, inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiriquí bajo el código EXT.DOC./PROYECTO No.010-2023.

1. Área de Biología Vegetal, Universidad Autónoma de Chiriquí

2. Herbario Universidad Autónoma de Chiriquí (UCH)

3. Centro de Investigación de Cultivo de Tejidos Vegetales

Parque Biblioteca Boquete



Mapa de las instalaciones disponibles para todo público y de manera gratuita; en un horario de 6:00 am a 5:30 pm de lunes a domingos

Guía fotográfica con datos básicos de plantas localizadas dentro de las instalaciones de este Parque Biblioteca Boquete.



Acalypha alopecuroides Jacq.
Familia: Euphorbiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Acalypha diversifolia Jacq.
Familia: Euphorbiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, hospedero de mariposas



Agave shaferi Trel.
Familia: Asparagaceae
Origen: Cuba
Utilidad: ornamental



Ageratum conyzoides L.
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: maleza, medicinal, melífera



Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex R. Keith
Familia: Arecaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: comestible, medicinal, ornamental



Adonidia merrillii (Becc.) Becc.
Familia: Arecaceae
Origen: Filipinas, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental, comestible



Aiouea chavarriana (Hammel) R.Rohde
Familia: Lauraceae
Origen: Costa Rica y Panamá
Utilidad: alimento de aves



Aiouea montana (Sw.) R.Rohde
Familia: Lauraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, maderable



Agapanthus sp. L'Hér.
Familia: Amaryllidaceae
Origen: Sudáfrica, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental



Agave de-meesteriana Jacobi
Familia: Asparagaceae
Origen: México
Utilidad: comestible, ornamental



Aiouea neurophylla (Mez & Pittier) R.Rodhe
Familia: Lauraceae
Origen: Centroamérica
Utilidad: no conocida



Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.
Familia: Zingiberaceae
Origen: Malasia, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental



Anacardium excelsum Skeels
 Familia: Anacardiaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: comestible, medicinal, maderable



Annona muricata L.
 Familia: Annonaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: comestible, medicinal, tóxica



Bauhinia acuminata L.
 Familia: Fabaceae
 Origen: Malasia, Indonesia, Filipinas,
 introducido en Panamá
 Utilidad: ornamental, medicinal



Bauhinia picta (Kunth) DC.
 Familia: Fabaceae
 Origen: Panamá, Suramérica
 Utilidad: ornamental



Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.
 Familia: Fabaceae
 Origen: América del Sur, introducida en Panamá
 Utilidad: forrajera, ornamental



Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.
 Familia: Orchidaceae
 Origen: Sureste Asia, introducida en Panamá
 Utilidad: ornamental



Bidens pilosa L.
 Familia: Asteraceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: maleza, medicinal




Bocconia frutescens L.
 Familia: Papaveraceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: medicinal, tóxica, maleza



Asclepias curassavica L.
 Familia: Apocynaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: medicinal, tóxica, ornamental



Baccharis trinervis Pers.
 Familia: Asteraceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: melfera, medicinal



Bougainvillea glabra Choisy var. *sanderiana* variegata
 Familia: Nyctaginaceae
 Origen: Brasil, introducida en Panamá
 Utilidad: ornamental, medicinal



Bougainvillea spectabilis Willd.
 Familia: Nyctaginaceae
 Origen: Brasil, introducida en Panamá
 Utilidad: ornamental, medicinal, tóxica



Browallia americana L.
Familia: Solanaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, medicinal



Brugmansia suaveolens (Willd.) Sweet
Familia: Solanaceae
Origen: Perú, introducido en Panamá
Utilidad: tóxica, ornamental



Calyptocarpus vialis Less.
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: maleza



Calliandra houstoniana var. *calothyrsus*
(Meisn.) Barneby
Familia: Fabaceae
Origen: México a Centroamérica
Utilidad: medicinal, leña, forraje



Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth.
Familia: Solanaceae
Origen: América del Sur, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental, melífera, tóxica



Bursera simaruba (L.) Sarg.
Familia: Burseraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: cercas vivas, medicinal



Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B.Pastore
Familia: Lamiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Castilleja arvensis Schltdl. & Cham.
Familia: Orobanchaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, maleza



Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Familia: Malpighiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: comestible, maderable, colorante



Cajanus cajan (L.) Millsp.
Familia: Fabaceae
Origen: India, introducido en Panamá
Utilidad: comestible, forraje, medicinal



Cecropia obtusifolia Bertol.
Familia: Urticaceae
Origen: México a Centroamérica
Utilidad: medicinal, restauración ecológica,
hábitat de hormigas *Azteca*



Cenchrus setosus Sw.
Familia: Poaceae
Origen: África, introducida en Panamá
Utilidad: forraje, ornamental



Cestrum tomentosum L.f.
Familia: Solanaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Cissampelos pareira L.
Familia: Menispermaceae
Origen: pantropical
Utilidad: medicinal



Clethra mexicana DC.
Familia: Clethraceae
Origen: México y Centroamérica
Utilidad: maderable, restauración ecológica



Cocos nucifera L.
Familia: Arecaceae
Origen: pantropical
Usos: comestible, medicinal, artesanal



Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis
Familia: Vitaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, maleza



Citharexylum cooperi Standl.
Familia: Verbenaceae
Origen: Centroamérica
Utilidad: ornamental, maderable



Colocasia esculenta (L.) Schott (Black Night)
Familia: Araceae
Origen: Asia tropical
Utilidad: ornamental, comestible, tóxica



Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. (Excellent)
Familia: Euphorbiaceae
Origen: Malasia
Utilidad: ornamental, tóxico



Citrus x limonia Osbeck
Familia: Rutaceae
Origen: India, Bangladesh
Utilidad: comestible, medicinal



Cleome pilosa Benth.
Familia: Cleomaceae
Origen: Neotropical
Utilidad: medicinal



Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. (Zanzibar)
Familia: Euphorbiaceae
Origen: Malasia
Utilidad: ornamental, tóxico



Commelina diffusa Burm. f.
Familia: Commelinaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: forraje, maleza, medicinal



Coleus amboinicus Lour.
Familia: Lamiaceae
Origen: Asia
Utilidad: medicinal



Cosmos sulphureus Cav.
Familia: Asteraceae
Origen: México, Centroamérica
Utilidad: ornamental, maleza, medicinal



Cyclanthera carthagenensis (Jacq.) H.Schaef & S.S.Renner
Familia: Cucurbitaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: comestible



Cyperus alternifolius L.
Familia: Cyperaceae
Origen: África y Península Arábig
Utilidad: medicinal, ornamental



Croton draco Schltl.
Familia: Euphorbiaceae
Origen: México a Colombia
Utilidad: medicinal, ornamental



Croton schiedeana Schltl.
Familia: Euphorbiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, hospedero de mariposas



Dahlia sp. Cav.
Familia: Asteraceae
Origen: México
Utilidad: ornamental, medicinal, comestible



Diphysa americana (Mill.) M.Sousa
Familia: Fabaceae
Origen: México a Panamá
Utilidad: cercas vivas, ornamental, maderable



Cupressus lusitanica Mill.
Familia: Cupressaceae
Origen: México a Guatemala
introducida en Panamá
Utilidad: ornamental, medicinal, maderable



Cycas revoluta Thunb.
Familia: Cycadaceae
Origen: Japón
Utilidad: ornamental, tóxica



Dracaena fragans (L.) Ker Gawl.
Familia: Asparagaceae
Origen: África tropical
Utilidad: ornamental, cerca viva



Drymaria cordata Willd. ex Schult.
Familia: Caryophyllaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: maleza



Elephantopus mollis Kunth
 Familia: Asteraceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: maleza, medicinal



Eleusine indica (L.) Gaertn.
 Familia: Poaceae
 Origen: África
 Utilidad: maleza, forrajera, medicinal



Erythrina fusca Lour.
 Familia: Fabaceae
 Origen: Neotropical
 Utilidad: ornamental, sombra de café



Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil.
 Familia: Erythroxylaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: maderable, medicinal



Emilia sonchifolia (L.) DC.
 Familia: Asteraceae
 Origen: Asia, introducida en Panamá
 Utilidad: maleza, medicinal, melífera



Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
 Familia: Rosaceae
 Origen: China
 Utilidad: comestible, medicinal, ornamental



Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.
 Familia: Zingiberaceae
 Origen: Indonesia, introducida en Panamá
 Utilidad: ornamental, comestible, medicinal



Eucalyptus deglupta Blume
 Familia: Myrtaceae
 Origen: Oceanía, Filipinas
 Utilidad: maderable, ornamental, medicinal



Eryngium foetidum L.
 Familia: Apiaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: comestible, medicinal



Erythrina berteroana Urb.
 Familia: Fabaceae
 Origen: México a Perú, Antillas
 Utilidad: medicinal, cercas vivas



Euphorbia heterophylla L.
 Familia: Euphorbiaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: medicinal, maleza



Euphorbia hirta L.
 Familia: Euphorbiaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: medicinal



Eugenia florida DC.
Familia: Myrtaceae
Origen: Costa Rica a N y C Suramérica
Utilidad: construcción, medicinal, comestible



Ficus pertusa L.f.
Familia: Moraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, alimento de primates, aves y murciélagos



Ficus trigonata L.
Familia: Moraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, medicinal, alimento de primates, aves y murciélagos



Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Familia: Asteraceae
Origen: Mesoamérica
Utilidad: maleza



Gmelina arborea Roxb.
Familia: Lamiaceae
Origen: Sudeste asiático (India)
Utilidad: madera, forraje, medicinal



Hamelia patens Jacq.
Familia: Rubiaceae
Origen: Neotropical
Utilidad: ornamental, medicinal



Heliconia latispatha Benth.
Familia: Heliconiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental



Heliconia psittacorum L.f.
Familia: Heliconiaceae
Origen: Sur América, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental



Hedychium coronarium J.Koenig
Familia: Zingiberaceae
Origen: Asia, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental



Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
Familia: Hydrangeaceae
Origen: Japón
Utilidad: ornamental, tóxica



Hypoxis decumbens L.
Familia: Hypoxidaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: no conocida



Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss
Familia: Amaryllidaceae
Origen: Suramérica
Utilidad: ornamental



Hyptis capitata Jacq.
Familia: Lamiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, maleza



Impatiens flaccida Arn.
Familia: Balsaminaceae
Origen: India, Sirilanka
Utilidad: ornamental



Ipomoea indica Merr.
Familia: Convolvulaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, maleza



Juglans nigra L.
Familia: Juglandaceae
Origen: Norteamérica
Utilidad: maderable, comestible



Inga densiflora Benth.
Familia: Fabaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: comestible, madera, alimento de aves
sombra en cafetales



Inga spectabilis (Vahl) Willd.
Familia: Fabaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: maderable, comestible




Kohleria spicata Oerst.
Familia: Gesneriaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, tóxica



Jatropha integerrima Jacq.
Familia: Euphorbiaceae
Origen: Cuba, Haití, República Dominicana
Utilidad: Ornamental, tóxica



Inga vera Willd.
Familia: Fabaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: comestible, madera, alimento de aves,
medicinal, melífera



Iochroma arborescens (L.) J.M.H.Shaw
Familia: Solanaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: alimento para aves y mamíferos, melífera



Lantana camara L.
Familia: Verbenaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, ornamental, melífera, tóxica



Laportea aestuans (L.) Chew
Familia: Urticaceae
Origen: Madagascar introducida en los trópicos
Utilidad: medicinal, fibras, tóxica, maleza



Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
 Familia: Fabaceae
 Origen: México, introducida en Panamá
 Utilidad: forrajera, comestible, medicinal,
 fijadora de nitrógeno



Lobelia xalapensis Kunth
 Familia: Campanulaceae
 Origen: Mesoamérica
 Utilidad: no conocida



Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L
 Jacobs
 Familia: Poaceae
 Origen: África
 Utilidad: forrajera, invasora



Melanthera nivea (L.) Small
 Familia: Asteraceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: maleza, melífera, atrae mariposas



Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven
 Familia: Onagraceae
 Origen: pantropical
 Utilidad: medicinal, comestible, maleza



Ludwigia peruviana (L.) H.Hara
 Familia: Onagraceae
 Origen: Pantropical
 Utilidad: medicinal, maleza



Melochia lupulina Sw.
 Familia: Malvaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: maleza



Melothria pendula L.
 Familia: Cucurbitaceae
 Origen: Neotrópicos
 Usos: medicinal, comestible



Mangifera indica L.
 Familia: Anacardiaceae
 Origen: India, Indochina, introducido en Panamá
 Utilidad: comestible, medicinal, maderable



Mauria heterophylla Kunth
 Familia: Anacardiaceae
 Origen: Costa Rica a Suramérica
 Utilidad: maderable, tóxica



Miconia xalapensis (Bonpl) M.Gómez
 Familia: Melastomataceae
 Origen: México a Colombia
 Utilidad: comestible



Mimosa debilis Humbl. & Bonpl. ex Willd.
 Familia: Fabaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: maleza



Monoon longifolium (Sonn.) B.Xue & R.M.K.Saunders
 Familia: Annonaceae
 Origen: India y Srilanka
 Utilidad: ornamental, maderable



Murraya paniculata Kaneh.
 Familia: Rutaceae
 Origen: Sudeste de Asia
 Utilidad: ornamental, medicinal, tóxico



Oplismenus undulatifolius P.Beauv.
 Familia: Poaceae
 Origen: Asia
 Utilidad: maleza



Oxalis corniculata L.
 Familia: Oxalidaceae
 Origen: Sudeste Asia
 Utilidad: ornamental, comestible



Myrcia amazonica DC.
 Familia: Myrtaceae
 Origen: Mesoamérica
 Utilidad: medicinal



Myrcia paivae O.Berg
 Familia: Myrtaceae
 Origen: Neotropical
 Utilidad: medicinal




Oxalis latifolia Kunth
 Familia: Oxalidaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: maleza, ornamental, medicinal



Passiflora biflora Lam.
 Familia: Passifloraceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: alimento para larvas de mariposas



Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.
 Familia: Primulaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: maderable



Myrsine pellucidopunctata Oerst.
 Familia: Primulaceae
 Origen: Colombia a Nicaragua
 Utilidad: cercas vivas, medicinal



Peperomia pellucida (L.) Kunth
 Familia: Piperaceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: alimenticia, medicinal



Persea americana Mill.
 Familia: Lauraceae
 Origen: Neotrópicos
 Utilidad: comestible, maderable, medicinal



Phenax mexicanus Wedd.
Familia: Urticaceae
Origen: Neotropical
Utilidad: medicinal



Phenax sonneratii (Poir.) Wedd.
Familia: Urticaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: maleza



Piper auritum Kunth
Familia: Piperaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, comestible



Piper linearifolium C.DC.
Familia: Piperaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, saborizante de alimentos



Philodendron erubescens K. Koch. & Augustin
Familia: Araceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental



Picramnia gracilis Tul.
Familia: Picramniaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: colorante, medicinal



Piper umbellatum L.
Familia: Piperaceae
Origen: Malasia, Neotrópicos
Utilidad: medicinal, maleza



Plantago australis Lam.
Familia: Plantaginaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Pinus caribaea Morelet
Familia: Pinaceae
Origen: México a Nicaragua, introducido en Panamá
Utilidad: Maderable, ornamental, medicinal



Piper aduncum L.
Familia: Piperaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague
Familia: Bignoniaceae
Origen: Sudáfrica, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental



Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: comestible, medicinal



Prosthechea livida (Lindl.) W.E.Higgins
Familia: Orchidaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Ricinus communis L.
Familia: Euphorbiaceae
Origen: África, introducido en Panamá
Utilidad: tóxica, medicinal



Ruellia simplex C.Wright
Familia: Acanthaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental



Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl)
Rohr ex C.F.Baker
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: maleza, forraje, medicinal



Pseudosamanea carbonaria (Britton) E.J.M.Koenen
Familia: Fabaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: restauración ecológica, forraje, madera



Schaueria calytricha (Otto ex. Hook.) Orb.
Familia Acanthaceae
Origen: Brazil
Utilidad: ornamental, atrae mariposas y colibríes



Scutellaria longifolia Benth.
Familia: Lamiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, atrae mariposas y colibríes



Psidium guajava L.
Familia: Myrtaceae
Origen: Neotropical
Utilidad: comestible, medicinal, melífera



Richardia scabra L.
Familia: Rubiaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: maleza, melífera



Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby
Familia: Fabaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, ornamental, hospedera de mariposas



Senna papillosa (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby
Familia: Fabaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: hospedera de mariposas, medicinal, ornamental



Sida sp. L.
Familia: Malvaceae
Origen: Pantropical
Utilidad: fibra vegetal, maleza




Sida jussiaeana DC.
Familia: Malvaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: no conocida



Solanum umbellatum Mill.
Familia: Solanaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: no conocida



Spathodea campanulata P.Beauv
Familia: Bignoniaceae
Origen: África, introducido en Panamá
Utilidad: ornamental



Silyrinchium micranthum Cav.
Familia: Iridaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Solanum americanum Mill.
Familia: Solanaceae
Origen: Centroamérica
Utilidad: medicinal, comestible



Sphagneticola trilobata (L.) Pruski
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, medicinal



Spondias purpurea L.
Familia: Anacardiaceae
Origen: Mesoamérica
Utilidad: comestible, cercas vivas



Solanum lycopersicum L.
Familia: Solanaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: alimento



Solanum rudepannum Dunal.
Familia: Solanaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal



Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl
Familia: Verbenaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, medicinal, atrae mariposas



Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl
Familia: Verbenaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, atrae mariposas y colibríes



Stellaria media (L.) Vill.
Familia: Caryophyllaceae
Origen: Eurasia
Utilidad: maleza, medicinal



Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
Familia: Bignoniaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: maderable, ornamental, restauración ecológica



Thunbergia mysorensis (Wight) T. Anderson
Familia: Acanthaceae
Origen: India
Utilidad: ornamental



Tillandsia fasciculata Sw.
Familia: Bromeliaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental



Tagetes patula L.
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, medicinal



Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Familia: Bignoniaceae
Origen: Mesoamérica
Utilidad: ornamental



Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental, forrajera




Torenia crustacea (L.) Cham. & Schtdl.
Familia: Linderniaceae
Origen: Asia y África
Utilidad: medicinal



Tecomaria capensis (Thunb.) Spach.
Familia: Bignoniaceae
Origen: Sudáfrica
Utilidad: ornamental, medicinal



Thunbergia alata Bojer ex Sims
Familia: Acanthaceae
Origen: África, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental, invasora



Trema micranthum (L.) Blume
Familia: Cannabaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: alimento de larvas de mariposas



Tridax procumbens L.
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, maleza



Vernanthura patens (Kunth) H. Rob.
Familia: Asteraceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: medicinal, melífera



Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl.
Familia: Salicaceae
Origen: Neotrópicos
Utilidad: ornamental



Zephyranthes rosea Lindl.
Familia: Amaryllidaceae
Origen: Suramérica, introducida en Panamá
Utilidad: ornamental, medicinal



Youngia japonica (L.) DC.
Familia: Asteraceae
Origen: Sudeste de Asia
Utilidad: maleza, medicinal



Yucca gigantea Lem.
Familia: Asparagaceae
Origen: Mesoamérica
Utilidad: ornamental, comestible



Zapoteca tetragona (Willd.) H.M. Hern.
Familia: Fabaceae
Origen: Mesoamérica
Utilidad: ornamental, forrajera



Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.
Familia: Amaryllidaceae
Origen: Suramérica
Utilidad: ornamental

Fuentes consultadas

Árboles, arbustos y palmas de Panamá. En:
<http://ctfs.si.edu/PanamaAtlas/findinfo.php?leng=spanish&specid=344>
consultado 4-11-23

Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. En:
<http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/apmtm/index.html>
consultado 4-11-23

Catálogo floral del Valle de Aburrá. En:
<https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/77>
consultado 30-4-24

Center for Aquatic and Invasive Plants: University of Florida. Plant Directory. En: <https://plants.ifas.ufl.edu/plant-directory/> consultado 11-8-24

Plant Finder, en:
<https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=283563> consultado: 27-11-23

Dendroflora de El Salvador. En:
https://portal.cybertaxonomy.org/salvador/cdm_dataportal/taxon/55ebe33e-0fd7-48c2-994f-d84b662180bf consultado: 27-11-23

Ecos del Bosque. En: <https://ecosdelbosque.com/>
De la Torre, L., Navarrete, H., Muriel, P., Macía, M. J., & Balslev, H. (2008). *Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador*. Herbario QCA de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador & Herbario AAU del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Aarhus.

Flora de Cuba en línea. En: https://portal.cybertaxonomy.org/flora-de-cuba-en-linea/cdm_dataportal/taxon/2a3771bd-f6a1-44e7-ac83-c1cdfbec9234 consultado 11-8-24

Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponible en: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/> consultado: 7-11-23

GBIF.org (2023). Disponible en: <https://www.gbif.org> consultado 7-1-23

Florafinder.org
https://www.florafinder.org/Species/Bougainvillea_glabra.php consultado 7-1-23

Global Biodiversity Information Facility. GBIF.org (2023). Disponible en: <https://www.gbif.org> consultado 25-4-23

Gupta, M.P., A.I. Santana, A. Espinoza. Monografía de Plantas Medicinales de Panamá. En <https://www.oas.org/es/sedi/femcidi/pubs/Libro%20de%20Plantas%20Medicinales%20de%20Panama.pdf> consultado 26-4-23

International Plant Names Index. En: <https://www.ipni.org/n/77120760-1> consultado 26-4-23

La Selva: Flórula Tropical. En: <https://sura.ots.ac.cr/florula4/index.php> consultado 3-11-23

Malezas de México. En: <http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm> consultado: 3-11-23

Pineda, A. G. (2006). *Flora útil: etnobotánica de Nicaragua*. Gobierno de Nicaragua, MARENA.

Plants of the World on Line en: <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77173630-1> consultado 14-10-23

Tramiletea. En: <https://www.tramil.net/es> consultado: 8-11-23

Useful Tropical Plants. En: <https://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Erythroxylum+citrifolium> consultado: 21-11-23

World Flora Online. En: <http://www.worldfloraonline.org> consultado: 14-2-23

Índice

<i>Acalypha alopecuroides</i> Jacq.	1
<i>Acalypha diversifolia</i> Jacq.	1
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex R. Keith	1
<i>Adonidia merrillii</i> (Becc.) Becc	1
<i>Agapanthus</i> sp. L'Hér.	1
<i>Agave de-meesteriana</i> Jacobi	1
<i>Agave shaferi</i> Trel.	2
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	2
<i>Aiouea chavarriana</i> (Hammel) R.Rohde	2
<i>Aiouea montana</i> (Sw.) R. Rohde	2
<i>Aiouea neurophylla</i> (Mez & Pittier) R.Rodhe	2
<i>Alpinia purpurata</i> (Vieill.) K. Schum.	2
<i>Anacardium excelsum</i> Skeels	3
<i>Annona muricata</i> L.	3
<i>Arachis pintoii</i> Krapov. & W.C. Greg.	3
<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.	3
<i>Asclepias curassavica</i> L.	3
<i>Baccharis trinervis</i> Pers.	3
<i>Bauhinia acuminata</i> L.	4
<i>Bauhinia picta</i> (Kunth) DC.	4
<i>Bidens pilosa</i> L.	4
<i>Bocconia frutescens</i> L.	4
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	4
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	4
<i>Browallia americana</i> L.	5
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Sweet	5
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Schltdl.) Benth.	5
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	5
<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth	5
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.	5
<i>Calyptocarpus vialis</i> Less.	6
<i>Calliandra houstoniana</i> var. <i>calothyrsus</i> (Meisn.) Barneby	6
<i>Cantinoa mutabilis</i> (Rich.) Harley & J.F.B.Pastore	6
<i>Castilleja arvensis</i> Schltdl. & Cham.	6
<i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol.	6
<i>Cenchrus setosus</i> Sw.	6
<i>Cestrum tomentosum</i> L.f.	7
<i>Cissampelos pareira</i> L.	7
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	7
<i>Citharexylum cooperi</i> Standl.	7
<i>Citrus x limonia</i> Osbeck	7
<i>Cleome pilosa</i> Benth.	7
<i>Clethra mexicana</i> DC.	8
<i>Cocos nucifera</i> L.	8
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott (Black Night)	8
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A.Juss. (Excellent)	8
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A.Juss. (Zanzibar)	8
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	8
<i>Coleus amboinicus</i> Lour.	9
<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	9
<i>Croton draco</i> Schltdl.	9
<i>Croton schiedeana</i> Schltdl.	9
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	9
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	9
<i>Cyclanthera carthagenensis</i> (Jacq.) H.Schaeff & S.S.Renner	10

<i>Cyperus alternifolius</i> L.	10
<i>Dahlia</i> sp. Cav.	10
<i>Diphysa americana</i> (Mill.) M.Sousa	10
<i>Dracaena fragans</i> (L.) Ker Gawl.	10
<i>Drymaria cordata</i> Willd. ex Schult.	10
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	11
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	11
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	11
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	11
<i>Eryngium foetidum</i> L.	11
<i>Erythrina berterioana</i> Urb.	11
<i>Erythrina fusca</i> Lour.	12
<i>Erythroxylum citrifolium</i> A.St.-Hil.	12
<i>Etilingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	12
<i>Eucalyptus deglupta</i> Blume	12
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	12
<i>Euphorbia hirta</i> L.	12
<i>Eugenia florida</i> DC.	13
<i>Ficus pertusa</i> L.f.	13
<i>Ficus trigonata</i> L.	13
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	13
<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	13
<i>Hamelia patens</i> Jacq.	13
<i>Heliconia latispatha</i> Benth.	14
<i>Heliconia psittacorum</i> L.f.	14
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	14
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	14
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	14
<i>Hippeastrum puniceum</i> (Lam.) Voss	14
<i>Hyptis capitata</i> Jacq.	15
<i>Impatiens flaccida</i> Arn.	15
<i>Inga densiflora</i> Benth.	15
<i>Inga spectabilis</i> (Vahl) Willd.	15
<i>Inga vera</i> Willd.	15
<i>Lochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw	15
<i>Ipomoea indica</i> Merr.	16
<i>Juglans nigra</i> L.	16
<i>Kohleria spicata</i> Oerst.	16
<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	16
<i>Lantana camara</i> L.	16
<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew	16
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	17
<i>Lobelia xalapensis</i> Kunth	17
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	17
<i>Ludwigia peruviana</i> (L.) H.Hara	17
<i>Mangifera indica</i> L.	17
<i>Mauria heterophylla</i> Kunth	17
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	18
<i>Melanthera nivea</i> (L.) Small	18
<i>Melochia lupulina</i> Sw.	18
<i>Melothria pendula</i> L.	18
<i>Miconia xalapensis</i> (Bonpl.) M.Gómez	18
<i>Mimosa debilis</i> Humbl. & Bonpl. ex Willd.	18
<i>Monoon longifolium</i> (Sonn.) B.Xue & R.M.K.Saunders	19
<i>Muraya paniculata</i> Kaneh.	19
<i>Myrcia amazonica</i> DC.	19

<i>Myrcia paivae</i> O.Berg	19
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	19
<i>Myrsine pellucidopunctata</i> Oerst.	19
<i>Oplismenus undulatifolius</i> P.Beauv.	20
<i>Oxalis corniculata</i> L.	20
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	20
<i>Passiflora biflora</i> Lam.	20
<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	20
<i>Persea americana</i> Mill.	20
<i>Phenax mexicanus</i> Wedd.	21
<i>Phenax sonneratii</i> (Poir.) Wedd.	21
<i>Philodendron erubescens</i> K. Koch. & Augustin	21
<i>Picramnia gracilis</i> Tul.	21
<i>Pinus caribaea</i> Morelet	21
<i>Piper aduncum</i> L.	21
<i>Piper auritum</i> Kunth	22
<i>Piper linearifolium</i> C.DC.	22
<i>Piper umbellatum</i> L.	22
<i>Plantago australis</i> Lam.	22
<i>Pluchea carolinensis</i> Jacq.) G.Don	22
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanfani) Sprague	22
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	23
<i>Prosthechea livida</i> (Lindl.) W.E.Higgins	23
<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (B. Juss. ex Aubl) Rohr ex C.F Baker	23
<i>Pseudosamanea carbonaria</i> (Britton) E.J.M.Koenen	23
<i>Psidium guajava</i> L.	23
<i>Richardia scabra</i> L.	23
<i>Ricinus communis</i> L.	24
<i>Ruellia simplex</i> C.Wright	24
<i>Schaueria calytricha</i> (Otto ex. Hook.) Orb.	24
<i>Scutellaria longifolia</i> Benth.	24
<i>Senna reticulata</i> (Willd.) H.S.Irwin & Barneby	24
<i>Senna papillosa</i> (Britton & Rose) H.S. Irwin & Barneby	24
<i>Sida</i> sp. L.	25
<i>Sida jussiaeana</i> DC.	25
<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.	25
<i>Solanum americanum</i> Mill.	25
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	25
<i>Solanum rupestrinum</i> Dunal.	25
<i>Solanum umbellatum</i> Mill.	26
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv	26
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	26
<i>Spondias purpurea</i> L.	26
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	26
<i>Stachytarpheta mutabilis</i> (Jacq.) Vahl	26
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	27
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC.	27
<i>Tagetes patula</i> L.	27
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	27
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach	27
<i>Thumburgia alata</i> Bojer ex Sims	27
<i>Thumburgia mysorensis</i> (Wight) T.Anderson	28
<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw.	28
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	28
<i>Torenia crusiacea</i> (L.) Cham. & Schltdl.	28
<i>Trema micranthum</i> (L.) Blume	28

Tridax procumbens L.28

Vernonanthura patens (Kunth) H.Rob.29

Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl.29

Youngia japonica (L.) DC.29

Yucca gigantea Lem.29

Zapoteca tetragona (Willd.) H.M.Hern.29

Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.29

Zephyranthes rosea Lindl.30

Fuentes consultadas30

Índice32

